

ブリの3大疾病を予防！

「マリンジェンナー® イリドビブレン3混」

バイオ科学(株)

バイオ科学(株)では、ブリのマダイイリドウイルス症、 α 溶血性レンサ球菌症およびビブリオ病(J-0-3型)の予防に効果を発揮する、注射式3種混合ワクチン「マリンジェンナー® イリドビブレン3混」を発売した。マダイイリドウイルスを培養細胞で増殖させて得られたウイルス液を不活化したものと、ラクトコッカス・ガルビエ KG-1型およびビブリオ・アングイラルム J-0-3型菌の培養菌液をそれぞれ不活化した後に濃縮・混合したワクチン。

用法・用量などは以下の通り。

【用法・用量】

ブリ(約10g~約100g)の腹腔内(腹鰭を体側に密着させたとき先端部が体側に接する付近の中心線上)に連続注射器を用い、0.1mLを1回注射する。

【一般的注意】

- ①本剤は、ブリのイリドウイルス感染症、 α 溶血性レンサ球菌症およびビブリオ病(J-0-3型)を予防するために使用し、ブリ以外の魚または動物には使用しないこと。
- ②本剤は、正しく使用しなければ病気の予防効果が得られないおそれがあるので、本使用説明書の「用法及び用量」に従って正しく使用すること。
- ③本剤は、体重約10~約100gの健康なブリに使用すること。
- ④本剤を低水温で使用した場合には病気の予防効果が得られないおそれがあるので、水温が約20~27℃の時に使用すること。
- ⑤本剤の注射は、指導機関(家畜保健衛生所、魚病指導総合センター、水産試験場等)において接種技術の指導を受けた者または獣医師のみが行うこと。
- ⑥本剤は、指導機関の直接の指導を受けて使用すること。
- ⑦本剤の使用に当たっては、連続注射器の使用説明書を十分に理解して適切に取扱うこと。

【内容量】

100mL(1,000尾分)、500mL(5,000尾分)

■問い合わせ先

バイオ科学(株)

〒779-1292

徳島県阿南市那賀川町工地 246-1

TEL 0884-42-3090

<http://www.bioscience.co.jp/>

